

デュタステリドを服用される患者様と

ご家族様へ

このお薬は、男性における男性型脱毛症の進行を止めるものです。6ヶ月以上服用しても、抜け毛の進行が遅くならない場合は、医師に相談してください。

薬の使い方

1. 1日1回、決められた量を服用してください。

2. 成人男性のみ、服用できます。

女性には効果が認められていません。

妊婦・授乳中の方が服用すると男子胎児の生殖器官等の正常発育に、影響を及ぼす恐れがあります。

3. 薬を割って飲まないでください。(割って服用した場合の安全性・有効性は保証されていません。)

妊娠中の方が破損した錠剤に触れ、成分が体内に吸収されると男子胎児の生殖器官等の正常発育に、影響を及ぼす恐れがあります。

(通常の取り扱いでは有効成分に触れることはありません)

服用上の注意

1. ご自身の判断で1日の服用量を変更、または服用を中止しないでください。
2. その日のうちに飲み忘れに気づいた場合は気づいた時にその日の分を服用してください。前日の飲み忘れに気づいた場合は当日の分のみを服用してください。(2回分を1度に飲んではいけません。)
3. 誤って多く服用した場合は、医師に相談してください。
4. この薬を家族や他人にあげないでください。
5. この薬の服用中、服用後1ヶ月間は輸血をしないでください。

次に当てはまる方は服用前に必ず医師に相談してください。

1. 今までに薬を服用して発疹などのアレルギーが出たことがある
2. 肝機能障害がある、またはあると言われたことがある。
3. 前立腺がん検診を受ける予定がある
4. 服用中の薬がある、または服用予定の薬がある
(市販薬も含む)
5. 男性型脱毛症に対して市販の育毛剤など他の対処法を行っている

副作用について

以下のような症状が出現する可能性があります。気になる症状がありましたらすぐに医師に相談してください。

1. 性欲減退
2. 勃起機能不全

まれに、食欲不振・全身倦怠感などの肝機能障害の症状が現れる可能性があります。すぐに服用をやめて医師の診察を受けてください。

当院では副作用の出現がないか定期的に採血にて確認を行っています。

その他注意事項

小児・未成年者が誤って服用することのないよう、保管場所には注意してください。(未成年者での安全性・有効性は確立されておりません。)

効果が確認できるまで服用を続けることが大切です。

ご自身の判断で飲む量を変更、または服用を中止しないでください。